

I Rok Informatyki: wykład 7  
Szeregi liczbowe i potęgowe

**Definicja 1.** Niech  $(a_n)$  - ustalony ciąg liczbowy. Określamy nowy ciąg:

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\vdots \\ S_n &= \sum_{k=1}^n a_k \\ &\vdots \end{aligned}$$

Ciąg sum częściowych  $(S_n)$  nazywamy szeregiem liczbowym i zapisujemy:  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

$S_n$  -  $n$ -ta suma częściowa

$a_n$  - wyraz ogólny szeregu

Jeżeli ciąg sum częściowych  $(S_n)$  jest zbieżny czyli  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ , to mówimy, że szereg jest zbieżny, a  $S$  nazywamy sumą szeregu. Piszemy  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ .

Przykład:

**Twierdzenie 1.** [Warunek konieczny zbieżności]

Jeżeli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny, to  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Dowód:

Jeżeli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny, to  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ .

Wtedy  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - S_{n-1} = S - S = 0$ .

Wniosek: jeżeli  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny.

Przykład 1.

Przykład 2.

**Definicja 2.** [Szeregi Dirichleta (harmoniczne rzędu  $r$ )]

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^r} = \begin{cases} \text{zbieżny dla } r > 1 \\ \text{rozbieżny dla } r \leq 1 \end{cases},$$

Przykład

**Definicja 3.** [Szeregi geometryczne:]

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \begin{cases} \text{zbieżny i } S = \frac{1}{1-q} \text{ dla } |q| < 1 \\ \text{rozbieżny dla } |q| \geq 1 \end{cases}$$

Przykład

## SZEREGI O WYRAZACH NIEUJEMNYCH

Niech  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ,  $a_n \geq 0$  dla każdego  $n \in \mathbb{N}$ .

**Kryterium porównawcze:**

Jeżeli dane są dwa szeregi  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  i  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  takie, że  $0 \leq a_n \leq b_n$  (dla każdego  $n$  lub dla każdego  $n \geq n_0$ ), to:

- 1) jeżeli  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  jest zbieżny, to  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  też jest zbieżny,
- 2) jeżeli  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny, to  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  też jest rozbieżny.

Przykłady:

Pomnożenie szeregu przez liczbę oraz pominięcie skończonej ilości jego wyrazów nie wpływa na jego zbieżność.

**Kryterium ilorazowe d'Alamberta**

Niech  $a_n > 0$ .

Jeżeli  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = g$ , to:

- 1) szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny, gdy  $g < 1$ ,
- 2) szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny, gdy  $g > 1$ ,
- 3) kryterium nie rozstrzyga, gdy  $g = 1$ .

Przykład:

### Kryterium pierwiastkowe Cauchy'ego

Niech  $a_n \geq 0$ .

Jeżeli  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = g$ , to:

- 1) szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny, gdy  $g < 1$ ,
- 2) szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny, gdy  $g > 1$ ,
- 3) kryterium nie rozstrzyga, gdy  $g = 1$ .

Przykład:

### Kryterium całkowe

Niech  $a_n > 0$  oraz  $a_n > a_{n+1}$ .

Jeżeli  $a_n = f(n)$ , to tworzymy funkcję malejącą  $f(x)$ , (zastępując zmienną  $n \in \mathbb{N}$  zmienną  $x \in \mathbb{R}$ ). Wtedy

1) jeżeli całka  $\int_1^{\infty} f(x)dx$  jest zbieżna, to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny.

2) jeżeli całka  $\int_1^{\infty} f(x)dx$  jest rozbieżna, to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny.

Przykład:

## SZEREGI NAPRZEMIENNE

-szeregi o wyrazach na przemian dodatnich i ujemnych:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ ,  $a_n > 0$ .

### Kryterium Leibniza

Jeżeli  $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \dots$  i  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$  jest zbieżny.

Przykład:

## SZEREGI O WYRAZACH DOWOLNYCH

$$(*) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ szereg o wyrazach dowolnych}$$

$$(**) \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ szereg wartości bezwzględnych}$$

Jeżeli szereg (\*\*) jest zbieżny, to szereg (\*) jest zbieżny (i mówimy, że jest zbieżny bezwzględnie).

Jeżeli szereg (\*\*) jest rozbieżny, a szereg (\*) jest zbieżny, to mówimy, że (\*) jest zbieżny warunkowo.

Przykłady:

## SZEREGI FUNKCYJNE

**Definicja 4.** Ciąg funkcyjny w zbiorze  $X$  jest to przyporządkowanie każdej liczbie naturalnej dokładnie jednej funkcji określonej w tym zbiorze:

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow f_1(x) \\ 2 &\rightarrow f_2(x) \\ &\vdots \\ n &\rightarrow f_n(x) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Oznaczenia:

$(f_n(x))$  – ciąg funkcyjny  
 $f_n(x)$  –  $n$ -ty wyraz ciągu

Przykłady:

**Definicja 5.** [granicy ciągu funkcyjnego]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \iff \forall \epsilon > 0 \forall x \in X \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

**Definicja 6.** [szeregu funkcyjnego] Niech  $(f_n(x))$  - ustalony ciąg funkcyjny na  $X$ . Ciąg  $(S_n(x))$  sum  $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$  nazywamy szeregiem funkcyjnym i piszemy:

$$(*) \quad \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

Szereg  $(*)$  jest zbieżny w zb.  $X$ , jeżeli ciąg jego sum częściowych  $(S_n(x))$  jest zbieżny. Wtedy:

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$$

Badanie zbieżności szeregu  $(*)$ :

1. ustalamy  $x$ ,
2. badamy zbieżność bezwzględną szeregu  $(*)$  traktując go jak szereg liczbowy,
3. Z odpowiedniego kryterium wyznaczamy obszar zbieżności tego szeregu.

Przykłady:

## SZEREGI POTĘGOWE

**Definicja 7.** [szeregu potęgowego]

$$(*) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n, \quad x_0 = \text{const}, \quad a_n - \text{ustalony ciąg liczbowy.}$$

**Definicja 8.** Promieniem zbieżności szeregu potęgowego nazywamy liczbę określoną następująco:

$$R = \sup\{r : |x - x_0| < r \wedge \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n - \text{zbieżny}\}$$

**Twierdzenie 2.** *Jeżeli istnieje granica*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lambda \text{ dla } a_n \neq 0 \text{ lub } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lambda$$

to:

$$R = \begin{cases} 0 & \text{gdy } \lambda = +\infty \\ \frac{1}{\lambda} & \text{gdy } 0 < \lambda < +\infty \\ +\infty & \text{gdy } \lambda = 0 \end{cases},$$

Przykłady:

## SZEREGI TAYLORA I MACLAURINA

**Definicja 9.** *Szeregiem Taylora odpowiadającym danej funkcji  $f$ , która w pewnym otoczeniu  $Q(x_0, \delta)$  ma pochodne wszystkich rzędów, nazywamy szereg potęgowy:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \text{ dla } x \in Q(x_0, \delta)$$

*Piszemy*

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

*Jeżeli  $x_0 = 0$ , to szereg nazywamy szeregiem Maclaurina.*



Uwaga. Szereg Taylora (Maclaurina) odpowiadający danej funkcji może być zbieżny, ale niekoniecznie do tej funkcji, albo rozbieżny.

Jeżeli

$$(*) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

to mówimy, że funkcja jest rozwijalna w szereg Taylora (Maclaurina).

**Twierdzenie 3.** *Jeżeli*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$$

*i*  $\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = 0$ , *to funkcja*  $f$  *jest rozwijalna w*  $Q(x_0, \delta)$  *i zachodzi*  $(*)$ .

Przykłady: